

RECOMMANDATIONS
SUITE À UNE GREFFE GINGIVALE

CENTRE DENTAIRE



DUPUIS/AISSA/MEAGHER
& ASSOCIÉS

DUPUIS AISSA MEAGHER & ASSOCIÉS

69, rue Baby, Joliette
(Québec) J6E 2V4
T 450.755.DENT (3368)

BROSSAGE :

Il est contre-indiqué de se brosser les dents autour de la région greffée pendant une semaine. Éviter de tirer la lèvre vers le bas, ceci pourrait déplacer le greffon.

COMMENT SE RINCER LA BOUCHE :

Irriguer la région palatine avec une petite seringue de plastique et un rince-bouche à la chlorhexidine. Rincer, la 2^e semaine seulement, l'ensemble de la bouche deux fois par jour avec 20 ml de rince-bouche pendant 30 secondes. Ne pas rincer la 1^{re} semaine, pour éviter que le pansement décolle.

ALIMENTATION :

Diète molle pendant les 2-3 premiers jours de l'intervention. Éviter les aliments trop chauds, trop froids, trop acides ou trop épicés pour les premières 48 heures.

PLAQUE PALATINE :

Porter la plaque palatine pour les repas. Toujours l'enlever la nuit et la laisser tremper dans un rince-bouche antibactérien ou un nettoyant pour prothèses dentaires. La nettoyer après chaque repas avec un dentifrice et une brosse à dents.

CIGARETTES :

Éviter de fumer deux semaines avant l'intervention et une semaine après. Le greffon est fragile et susceptible de subir un échec chez un patient fumeur.

ANTIDOULEUR :

Prendre les analgésiques tel que recommandé par votre dentiste.

SAIGNEMENT :

En cas de saignement prolongé au palais, maintenir une pression avec les cotons fournis, pendant 20 à 30 minutes.